

doraQuest<sup>®</sup>  
duo

# doraQuest<sup>®</sup> duo

*larga acción*

USO VETERINARIO

doramectina 1.78% (p/p), praziquantel 22.29 % (p/p)

asociación antihelmíntica - tenicida de amplio espectro y larga acción  
para su uso en equinos de toda raza, pasta de agradable sabor a manzana

**DOSIS:** Vía oral. 200 mcg de doramectina por kg/p.v. y 2.5 mg de praziquantel/kg p.v., (una jeringa de 6.73 g alcanza para tratar un animal de 600 kg). La jeringa tiene 6 marcas, cada marca dosifica producto para 100 kg de peso vivo.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** Antiparasitario de acción total para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales, pulmonares y cestodes) y externas. Su espectro de acción incluye: grandes Strongylus (adultos y larvas migrans), pequeños Strongylus, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Trichostrongylus axei*, *Habronema muscae*, *Draschia spp.*, *Dictyocaulus arnfieldi*, *Onchocerca spp.*, piojos y miasis causada por *Gasterophilus spp* y *Collitroga spp.*; Cestodes: por su dosis de 2.5 mg/kg, permite tratar *Anoplocephala spp.* y *Paranoplocephala mamillana*. Mantener alejado del alcance de los niños. **Información adicional en el inserto adjunto.**

# doraQuest<sup>®</sup> duo

*larga acción*

USO VETERINARIO

doramectina 1.78% (p/p), praziquantel 22.29 % (p/p)

asociación antihelmíntica - tenicida de amplio espectro y larga acción  
para su uso en equinos de toda raza, pasta de agradable sabor a manzana



doraQuest<sup>®</sup>  
duo

doraQuest<sup>®</sup> es una marca registrada de Agrovete market S.A.



Fabricado en el Perú por Laboratorio Hofarm S.A.C para  
agrovet market s.a.

Pedro Martínez Ching. CMVP 1446. M.V. Resp. Emp. Titular: Umberito Calderón O. CMVP 2944. Reg. SENASA Perú:  
Consumo humano. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Mantener alejado del alcance de los niños. M.V. Resp. Emp. Fabr.:  
ser administrado a animales de calidadiedad en cualquier momento de la prehez pues no es teratogénico ni embriotoxico. No usar en animales destinados al